

MULTIPLICAR AROMÁTICAS

Además de por **semillas**, las hierbas aromáticas, de condimento y medicinales pueden propagarse **por otros 3 métodos** que son los que vamos a ver a continuación.

- **Semillas**
- **Esquejes**
- **Acodo**
- **División de mata**

ESQUEJES

1. Hacer los esquejes o estaquillas de los brotes surgidos en el año, en esa primavera, cortándolos **a finales de primavera o en verano**. Los esquejes también se pueden hacer más adelante, **hasta mitad del otoño**.

2. Cortar las estaquitas semileñosas con una longitud de 8 a 15 cm. Deben llevar 2 o más yemas o nudos.

3. Cortar la base de cada esqueje justo por debajo de un nudo y quitar las hojas inferiores dejando sólo las 2, 3 ó 4 superiores.

4. Impregnar la base con un poco de **polvo de hormonas de enraizamiento**. No es imprescindible hacerlo, pero ayuda a que eche raíces. Las hormonas también se venden en forma líquida en cualquier vivero.



5. Plántarlos cuanto antes para que no se resequen.

6. Preparar macetas o bandejas rellenas con turba o compost mezclado con arena de río lavada mitad y mitad. En reemplazo de la arena, se puede utilizar perlita.



7. Clavar los esquejes introduciendo el tercio inferior en el sustrato y apretar con los dedos.

8. Regar y cubrir la maceta o bandeja con una bolsa de plástico clavándolo con palitos o alambres de forma que las hojas no rocen el plástico. Si no se utiliza una bolsa, una lámina de polietileno transparente o frascos de vidrio en macetas individuales servirá para mantener la humedad alrededor de las estaquitas. Habrá que ventilar cada tanto para evitar la condensación.



9. Colocar todo en un lugar con temperatura suave (alrededor de 20°C) y que no reciba sol directo ni corrientes de aire.

10. Mantener el sustrato húmedo, no encharcado. Al cabo de varias semanas el esqueje desarrollará raíces por su base y se dispondrá de una nueva planta.

11. Para pasar el primer invierno, debido a que la planta todavía es delicada, mantener las macetas dentro de la casa o en un invernadero.



12. La primavera siguiente ya estarán listos para trasplantar a macetas individuales, por ejemplo de 10 cm de diámetro. Luego de unos cuantos días de aclimatación pueden recibir la luz del sol. Ponerles un poco de humus de lombriz en la nueva macetita.




ACODO


• Acodo simple (Ejemplos: Salvia y Tomillo)

1. Se suele hacer en primavera y sacar la rama enraizada en otoño. En clima cálido también se puede hacer en otoño y sacar en primavera del año siguiente.

2. Escoger tallos largos y flexibles de Salvia o de Tomillo.



3. Sin separarlos de la planta, extraer con una navaja afilada la corteza de un anillo de unos 2 cm. de longitud (mirar el dibujo inferior). Poner en la superficie del corte **polvo de hormonas de enraizamiento** para favorecer la emisión de raíces.



El anillado lo que hace es retener ahí la savia descendente para que no llegue a las raíces y se acumule en ese punto estimulando la rizogénesis.


4. **Enterrar en el suelo esta parte herida y fijarlo con un alambre.** Cubrir con un poco de tierra o mejor, con una mezcla de turba y tierra. Al cabo de unos meses habrá echado raíces en ese punto y ya se podrá cortar por debajo de las raíces y pasar a una maceta como planta independiente.



• Acodo por amontonamiento

Por este método de Acodo de Amontonamiento se pueden multiplicar las siguientes especies de Aromáticas y condimentos: Ajedrea de invierno (Satureja montana), Ajenjo (Artemisia absinthium), Lavanda o Espliego, Santolina, Hisopo, Romero, Salvia, Tomillo, etc.

En primavera, amontonar tierra sobre la planta en la base; unos 7-12 centímetros. Utilizar preferentemente una mezcla de arena y compost. Esto provocará que de los tallos surjan raíces.



Colocar más cantidad de tierra o mezcla si la lluvia o el riego la va arrastrando hasta que se hayan formado raíces a finales de verano o en otoño. Luego, simplemente trabajar como si fuera una división de mata utilizando un cuchillo para separar los distintos vástagos enraizados.

DIVISIÓN DE MATA



Es un método muy sencillo y muy rápido para obtener nuevos ejemplares. Incluso, si no se desea tener más plantas, hay que dividir las igualmente para que el ejemplar no envejezca. Se procede de la siguiente manera:

1. Las plantas a las que se puede aplicar este método tienen que ser plantas que hayan ramificado bien por abajo, que tenga muchos brotes desde la base del suelo. Esto ocurrirá cuando tenga una cierta edad (más de 3 años).

2. La mejor época para hacerlo es en **primavera o a principios de otoño**. Como regla general, las plantas que florecen en primavera y al comienzo del verano, deben dividirse en otoño, mientras que las que florecen en verano y en otoño, deben de dividirse en primavera antes de que hayan crecido demasiado.

3. Procurar hacerlo con la **tierra ligeramente húmeda** con el fin de que no se desmorone el cepellón (terron de tierra) y no queden las raíces "peladas" al hacer la división.

4. Desenterrar toda la planta del suelo con una pala o con una azada, dañando lo menos posible las raíces.

5. Con las manos o con un cuchillo bien afilado, hacer 2, 3, 4 ó más partes, llevando cada una un trozo de raíz.

6. Finalmente se planta cada sección en la tierra enriquecida previamente con algo de compost o turba, o bien, se colocan en macetas.

7. Asentar bien con las manos la tierra para que no queden bolsas de aire y regar abundantemente.

ESPECIES DE AROMÁTICAS Y SUS MÉTODOS DE PROPAGACIÓN

Lavanda

Por esquejes. Tomar trozos de unos 10 cm. de tallos semimaduros en verano y seguir los pasos indicados. La base tiene que estar dura, aunque el extremo esté tierno.

Melisa

Siembra en primavera o en verano. Esquejes en primavera u otoño. Dividir la mata en primavera.

Menta

Por estolones en otoño y primavera a la sombra. Este procedimiento es el más práctico. Los estolones se disponen horizontalmente enterrados a 5-10 cm de profundidad

Poner rizomas de 8 a 12 cm de longitud en periodo de reposo vegetativo en otoño o en primavera muy temprano. Los rizomas se extraen en octubre-noviembre. Se colocan en primavera horizontalmente a 8 cm de profundidad.

División de las matas jóvenes en primavera o en otoño.

Orégano

División de mata en otoño o a principios de primavera.

Semillas durante el otoño o la primavera.

Esquejes en primavera.

Perejil

Se multiplica por semillas sembradas a intervalos desde primeros de primavera hasta finales de verano. Si se quiere tener perejil fresco durante el invierno, se siembra en agosto.

Las semillas tardan algo en germinar (1 mes). Para que germinen antes, ponerlas previa a la siembra en remojo toda una noche con agua templada.

Romero

Tomar esquejes de unos 8 centímetros que se cortan a principios de verano mejor. Arraigan con mucha facilidad. Es mejor que reproducirlo por semillas aunque también se puede (en primavera).

Salvia

Semillas sembrando en primavera. Esquejes. Acodo.

Tomillo

Semillas en primavera. División de la mata en primavera. Esquejes de estaca semimaduros a principios de verano. Acodo en primavera u otoño.